

Werkzaamheden moestuin april - juni

1. Buiten

Alvorens buiten te zaaien of te planten, denk eerst na over de organisatie (zie teeltwisseling). Om begieting en onkruid te limiteren (vooral tijdens de zomermaanden), kan het nuttig om grondbedekking te voorzien:

- Plaats eerst een worteldoek alvorens te planten.
- Of voorzie een plantaardige bedekking tussen de platen (bijvoorbeeld stro).

Aardappelen poten

Voorkiemen van het pootgoed:

Om korte stevige kiemen te bekomen, plaats het pootgoed in een frisse en lichte ruimte.

Poten van de aardappelen:

Plant de aardappelen op 10 à 15 cm diepte op 30 cm afstand van elkaar. Hou 50 cm afstand tussen de lijnen.

Opvolging teelt:

Bij risico op vorst, bescherm de blaadjes.

Aanaarden van de planten wanneer 15-20 cm groot: breng de aarde van tussen de lijnen naar de planten om zo ruggen te vormen.

Wees alert voor ziekten (zie groentefiche 'Aardappelen').

Uitplanten van voorgezaaide of gekochte plantjes

Algemene regels:

Het plantje klaarmaken:

- Bevochtigt de aarde door de pot een kwartier voor het uitplanten in water te zetten.
- Haal de plant voorzichtig uit zijn pot (zonder aan het plantje te trekken).
- Decompacteer de kluit aarde.
- Indien de wortels onderaan de pot aan het ronddraaien of terug omhoog aan het groeien zijn, maak de wortels dan voorzichtig los alvorens het plantje uit te planten.

Het perceel klaarmaken:

- Verwijder het onkruid en hark de aarde los.
- Maak een gat die iets groter is dan de kluit aarde van het plantje. Zet het plantje in het gat, vul met aarde en druk voorzichtig aan.
- Maak een klein gat (20-30 cm diepte) naast de plant om de plant op grotere diepte te kunnen bewateren.
- Voor vorstgevoelige planten wacht tot half mei voor het uitplanten of voorzie een bescherming (winterzeil, mini serre, tunnelerse,....).

Voorbeelden:

- Kool (witte, groene, rode): plant mei, oogst september.
- Spruiten: plant eind september/oktober, oogst in winter.
- Bloemkool: plant in april, oogst in september.
- Knolselderij: plant in mei-juni, oogst vanaf september.

Zaaien in volle grond:

Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn.

Zaai periode : is vooral afhankelijk van de bodemtemperatuur en het risico op nachtvorst. Vanaf half mei is er geen nachtvorst meer mogelijk en kunnen vorstgevoelige groenten buiten gezaaid of geplant worden. De zaaiperiode kan ook verschillen tussen verschillende variëteiten binnen één soort: kijk de informatie na op het zakje voor alle zekerheid.

Referentie datum: De IJsheiligen (15 mei)

Voor midden mei: alle planten die tegen vorst kunnen.

Na half mei: alle andere planten, op voorwaarde dat hun ontwikkeling niet te lang duurt.

Soort	GrondT° Kiemduur	Zaai periode	Opmerkingen	Afstand tus- sen zaailijnen
Biet	10 à 30 °C +/- 10 d.	April - mei	Zaaien in lijnen in groepjes van 3-4 zaden om de 20 cm. Dun uit wanneer de plantjes 2-3 echte bladeren hebben (1 plantje per groepje).	40 cm
Bonen (struik)	16 à 30 °C 5-8 dagen	Midden mei - midden augustus	Zaaien in lijnen om de 8-10 cm of in groepjes van 5-6 zaden om de 40 cm. Aanaarden wanneer de planten 2 à 3 bladeren hebben.	40 cm
Bonen (staak)	16 à 30°C 5-8 dagen	Midden mei tot eind juli	Zaaien in lijnen om de 8-10 cm of in groepjes van 6-7 zaden om de 50-60 cm. Plaats staken en netten tussen de lijnen of plaats aan de basis van elk groepje zaden een stok die je samenbindt tot een tipi (zaai hiervoor de groepjes in cirkelvorm). Aanaarden wanneer de plant 2-3 bladeren heeft.	70 cm
Kervel	5°C 8-10 dagen	Februari tot september	Zaai ondiep (0.5 cm) in lijnen, dun uit om 5 cm. Of uit de hand zaaien. Bij dit laatste wordt onkruid verwijderen wel een stuk lastiger.	20 cm
Knolraap	4 à 7 °C 3-5 dagen	Maart tot juni. Vanaf januari in koude serre.	Zaaien in lijnen, dun uit om de 10 cm.	20 cm
Koolrabi	10 à 30°C 4-8 dagen	Midden maart tot midden juli	Zaai in lijnen om de 30 cm.	40 cm
Sla (zomer)	5 à 27 °C 4-10 dagen	Maart - juni Vanaf februari in koude serre.	Voorzaaien in potjes en uitplanten om de 25 cm.	25 cm
Snijbiet	10 à 30°C 10-20 d.	April - mei	Zaaien in lijnen. In groepjes van 3-4 zaden om de 40 cm. Uitdunnen wanneer de plantjes 2-3 echte bladeren hebben (1 plantje per groep behouden).	40 cm
Wortel (bewaar)	7 à 30 °C 10-20 dagen	Vanaf midden juni (oogsten in herfst)	Zaaien in lijnen. Zaaien in banden. Uitdunnen op 5 cm wanneer de plantjes enkele bladeren hebben. <i>Eventueel tussen andere gewassen (ui, radijs,...).</i>	20-30 cm

Werkzaamheden moestuin april - juni

2. Binnen zaaien

Algemene regel : de hoeveelheid aarde waarmee je het zaadje bedekt, mag maximaal drie maal de breedte van het zaad zijn. Wanneer het zaadje ontkiemt, moet je deze in volle zon plaatsen. De planten moeten geleidelijk aan acclimatiseren aan de klimaatcondities buiten alvorens ze buiten uit te planten.

Zaaiperiode: hou rekening met de groeisnelheid en het moment van verspenen. Binnen elke soort kan dit variëren tussen de verschillende variëteiten.

• Deze teelten kunnen binnen opgestart worden maar ze kunnen ook rechtstreeks in volle grond gezaaid worden (zie hierboven punt 1).

Soorten	Bodem T° <i>Kiemduur</i>	Zaaiperiode	Opmerkingen
Biet	10 à 30°C <i>+/- 10 dagen</i>	April - juni	Zaai in groepjes van 2-3 zaden. Haal de plantjes uit elkaar en herplant. Voorzie 15 cm tussen elke plant.
Boon (stuik)	16-30°C <i>5 à 8 dagen</i>	Vanaf mei	Zaai 4 à 5 zaden per pot. De twee zaadlobben verschijnen eerst. Uitplanten na half mei. Hou 35 cm tussen elk groepje planten. Aard aan wanneer de plant 2 à 3 echte bladeren heeft.
Boon (staak)	16 à 30°C <i>5 - 8 dagen</i>	Vanaf eind april	Zaai 5 à 7 zaden per pot. De zaadlobben blijven onder de grond. Plant uit na half mei. Hou 50-60 cm afstand tussen de groepjes. Plaats een stok aan de basis van elk groepje. Bindt de stokken bovenaan samen met een koord om een tipi te vormen. Aard aan wanneer de planten 2 à 3 echte bladeren hebben. <i>Om te oogsten na de zomervakantie en niet tijdens: zaai begin juni, plant uit half juni, oogst in september.</i>
Sla (zomer)	5 à 27 °C <i>4 - 10 dagen</i>	Vanaf eind februari	Zaai in trays. Herplant in volle grond van zodra 2 à 3 echte bladeren (4-5 cm).
Snijbiet	15 à 30 °C <i>10 - 20 dagen</i>	April - mei	Zaai in groepjes van 2-3 zaden. Haal de plantjes uit elkaar en herplant. Voorzie 45 cm tussen elke plant.

• Volgende teelten worden binnen opgestart:

Soorten	Bodem T° Kiemduur	Zaaiperiode	Opmerkingen
Basilicum	7 à 30 °C	Vanaf midden april	Twee à drie zaadjes per potje zaaien. Uitplanten na half mei. Snoei de plant om vertakkingen te bevorderen en de bloei uit te stellen.
Courgette	21 à 35 °C 6 - 10 dagen	Vanaf midden april	Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het in twee te breken. Courgettes houden er namelijk niet van wanneer hun wortels los gerukt worden. Herplant na half mei wanneer de planten 3 à 4 echte blaadjes hebben. Voorzie 1 à 2 meter tussen elk plantje. Niet snoeien zoals bij de pompoen. <i>Om te kunnen oogsten na de zomervakantie: zaai in juni.</i>
Pompoen	20 à 25 °C 6 - 10 dagen	Vanaf midden april	Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het in twee te breken. Pompoenen kunnen er niet tegen als hun wortels uit elkaar gerukt worden. Herplant na de Ijsheiligen wanneer de planten 3 à 4 echte blaadjes hebben. Voorzie 1 à 2 meter tussen elk plantje. Snoei na 4 echte bladeren om vertakkingen en vruchtzetting te bevorderen.
Komkommer, augurken	16 à 35 °C 8 - 10 dagen	Vanaf eind april	Zaai 1 à 2 zaden in potten van 8 cm. Bewaar het sterkste plantje, maak het zwakste kapot door het in twee te breken. Plant uit na half mei, wanneer de plant 3 à 4 echte bladeren heeft en wanneer het voldoende warm is. Voorzie een structuur om op te klimmen en ongeveer 60 cm tussen elke plant. Snoei de top na minstens 3 echte bladeren om vertakkingen en vruchtzetting te bevorderen.